

## Zur Deckung des Aminosäurebedarfs bei Belastungen

**Alamin** dient der Deckung des Aminosäurebedarfs bei Belastung, während Stressphasen oder bei Mangelsituationen.

**Alamin** enthält die verschiedenen Aminosäuren, insbesondere die für den Federaufbau so wichtigen Aminosäuren Cystin und Methionin.

Zusätzlich sind Vitamin-B-Komplex, Mineralstoffe und leicht verdauliche Energielieferanten zugesetzt. Damit gleicht **Alamin** Mangelerscheinungen aus und regt zudem schonend den Stoffwechsel an.

### Zusammensetzung:

Traubenzucker, Trikaliumcitrat, Natriumacetat, Magnesiumsulfat, Monohydrat

### Analytische Bestandteile:

|                  |       |          |       |
|------------------|-------|----------|-------|
| Rohprotein       | 0,7 % | Rohfaser | 0 %   |
| Rohöle u. -fette | 0,2 % | Rohasche | 0,9 % |

### Zusatzstoffe pro kg:

|  |          |
|--|----------|
| Calcium-D-Pantothenat                          | 500 mg   |
| Niacinamid                                     | 7.500 mg |
| Vitamin B <sub>1</sub>                         | 500 mg   |
| Vitamin B <sub>2</sub> / Riboflavin            | 500 mg   |
| Vitamin B <sub>6</sub> / Pyridoxinhydrochlorid | 500 mg   |
| Vitamin B <sub>12</sub> / Cyanocobalamin       | 100 mg   |
| L-Valin  | 250 mg   |
| DL-Methionin                                   | 200 mg   |
| L-Lysin-Monohydrochlorid                       | 150 mg   |
| L-Arginin                                      | 125 mg   |
| L-Cystin                                       | 120 mg   |
| L-Threonin                                     | 100 mg   |
| L-Isoleucin                                    | 100 mg   |
| L-Tryptophan                                   | 50 mg    |
| Calciumlactat                                  |          |



**Alamin** ist besonders in Phasen einzusetzen, in denen der Vogelorganismus vermehrt B-Vitamine und Aminosäuren zum Aufbau von Eiweiß benötigt:

- im Wachstum
- in der Mauser
- in der Legeperiode

### Fütterungsempfehlung:

1–3 Messerspitzen (1/2 g) pro 10 ml Trinkwasser oder über die Tagesmenge Weichfutter.

### Zucht, Jungtiere, Mauser, Ausstellung:

- zum Ausgleich von Ernährungsmängeln  
2–3 x pro Woche
- ohne zusätzliche Belastung 1 x pro Woche

Nicht über 25°C und trocken lagern!  
Nach Anbruch aufbrauchen.

**Haltbarkeit:** 24 Monate

### Handelsform:

30 g Dose

