

Kautabletten zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung

Eine gesunde Darmflora ist nachweislich nicht nur für die Darmgesundheit selbst, sondern auch für ein gut funktionierendes Immunsystem verantwortlich. Wird die Darmflora aus ihrem Gleichgewicht gebracht, können sich pathogene Keime vermehren und es kann zu Verdauungsstörungen wie Durchfall kommen. Auch durch eine Antibiose kann die Darmflora negativ beeinträchtigt werden.

DiaTab[®] PRO bringt die Darmflora wieder ins Gleichgewicht, schützt die Darmschleimhaut, stabilisiert die Verdauung und kann so das Immunsystem unterstützen.

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale:

Futtermittelzusatzstoffe der Funktionsgruppe "Darmflorastabilisatoren"

Zusammensetzung:

Hefeprodukt, Dicalciumpyrophosphat, verarbeitetes tierisches Protein (Schweineleber), Johannisbrot, gemahlen, Fructo-Oligosaccharide, Natriumchlorid, Magnesiumsalze organischer Säuren (Stearin- und Palmitinsäure), Kaliumchlorid, Magnesiumsulfat.

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	15,5 %	Rohfaser	0,4 %
Rohöle u. -fette	1,2 %	Rohasche	51,5 %
Natrium	0,5 %	Kalium	0,7 %
Calcium	5,5 %	Phosphor	3,7 %

Zusatzstoffe pro kg:

<i>Technologischer Zusatzstoff:</i>	
Bentonit	380.000 mg
<i>Darmflorastabilisator:</i>	
<i>Enterococcus faecium</i> NICMB 10415	5,5 x 10 ¹¹ KBE

Fütterungsempfehlung:

Bei Gefahr von, während und nach Verdauungsstörungen:

Bei einem Gewicht			
bis 5 kg	2 x täglich	½ Tablette	
von > 5 - 15 kg	2 x täglich	1 Tablette	
von > 15 - 25 kg	2 x täglich	2 Tabletten	
von > 25 - 40 kg	2 x täglich	3 Tabletten	
über 40 kg	2 x täglich	4 Tabletten	



Enterococcus faecium ist ein probiotisches Milchsäure produzierendes Bakterium, das als lebender Mikroorganismus zur Stabilisierung der Darmflora beiträgt.

Präbiotische Fructo-Oligosaccharide und **Johannisbrotkerne** dienen als Nährstoffe für das Wachstum der erwünschten Mikroorganismen im Darm und tragen so zur Aufrechterhaltung einer gesunden Darmflora bei.

Bentonit ist ein Tonmineral mit starker Quellfähigkeit und hohem Wasserbindungsvermögen.

Empfohlene Fütterungsdauer:

Bis zu 4 Wochen. Eine Verlängerung der Fütterungsdauer ist unbedenklich. Es wird empfohlen, vor Verwendung des Futtermittels oder vor Verlängerung der Verwendungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Die Gabe kann wiederholt werden.

Wegen des erhöhten Gehaltes an Bentonit nur bis zu 5,2 % der Tagesration verfüttern. Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.

Nicht über 25 °C und trocken lagern!

Haltbarkeit: 24 Monate

Handelsform:

100 g Dose mit ca. 50 Tabletten à 2 g

